



SEMESTRAL

UNI

academiacesarvallejo.edu.pe

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

SEMESTRAL
UNI



GEOMETRÍA

Tema: Tronco de Pirámide y Cono

TRONCO DE PIRÁMIDE Y CONO

OBJETIVOS

1


CONOCER LAS RELACIONES ENTRE LOS VOLÚMENES Y SUPERFICIES DE DOS PIRÁMIDES Y CONOS SEMEJANTES.

2

CONOCER LA DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL TRONCO DE PIRÁMIDE Y TRONCO DE CONO.

3

RESOLVER PROBLEMAS TIPO EXAMEN DE ADMISION UNI.




PIRÁMIDES SEMEJANTES

Veamos:

Sea $\blacksquare M \parallel \blacksquare N$

SE CUMPLE



Pirámide
deficiente

M

Tronco de
pirámide

N

□ RAZÓN DE LÍNEAS:

$$\frac{VL}{VA} = \frac{VQ}{VC} = \frac{PQ}{BC} = \frac{h}{H} = \dots$$

□ RAZÓN DE ÁREAS:


$$\frac{\mathbb{B}}{\mathbb{A}} = \left(\frac{VL}{VA}\right)^2 = \left(\frac{VQ}{VC}\right)^2 = \left(\frac{h}{H}\right)^2 = \dots$$

□ RAZÓN DE VOLÚMENES:

$$\frac{\mathbb{V}_{V-LPQS}}{\mathbb{V}_{V-ABCD}} = \left(\frac{PQ}{BC}\right)^3 = \left(\frac{VQ}{VC}\right)^3 = \dots$$

PIRÁMIDES SEMEJANTES

■ $M \parallel N$



$$V_{\text{tronco de pirámide}} = \frac{h'}{3} (A + B + \sqrt{A \cdot B})$$

Comprobación:

- Notamos:

$$V_{\text{tronco de pirámide}} = \underbrace{V_{V-ABCD}}_{\frac{A(h+h')}{3}} - \underbrace{V_{V-LPQS}}_{\frac{B(h)}{3}}$$

$$V_{\text{tronco de pirámide}} = \frac{Ah'}{3} + \frac{h}{3} (A - B) \dots (i)$$

- Por pirámides semejantes: $\frac{B}{A} = \left(\frac{h}{h+h'} \right)^2 \rightarrow h = \frac{\sqrt{B}h'}{(\sqrt{A} - \sqrt{B})}$

- Reemplazamos en (i): $V_{\text{tronco de pirámide}} = \frac{Ah'}{3} + \frac{\sqrt{B}h'}{3(\sqrt{A} - \sqrt{B})} (A - B) \dots (ii)$

- Pero: $(A - B) = (\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B})$

- Reemplazamos en (ii): $\therefore V_{\text{tronco de pirámide}} = \frac{h'}{3} (A + B + \sqrt{A \cdot B})$

TRONCO DE PIRÁMIDE

EXAMEN UNI

En un tronco de pirámide $ABC - A_1B_1C_1$, los volúmenes de las pirámides $B_1 - ABC$ y $A - A_1B_1C_1$ miden V_1 y V_2 respectivamente. Determine el volumen de la pirámide $A - CB_1C_1$.

A) $\sqrt{V_1V_2}$


B) $\frac{V_1V_2}{V_1 + V_2}$

C) $\frac{2V_1V_2}{V_1 + V_2}$


D) $2\sqrt{V_1V_2}$

E) $3\sqrt{V_1V_2}$

- Veamos los sólidos por separado y tenemos lo siguiente:



Piden $V_{A-CB_1C_1} = V_x$



DATOS:

✓ $V_{B_1-ABC} = V_1$

✓ $V_{A-A_1B_1C_1} = V_2$

- Por volumen del tronco de pirámide:

$$V_{\text{tronco de pirámide}} = \frac{h}{3} (A + B + \sqrt{A \cdot B})$$

$$V_1 + V_x + V_2 = \frac{hA}{3} + \frac{hB}{3} + \frac{h\sqrt{AB}}{3}$$

$$\rightarrow V_x = \frac{h\sqrt{AB}}{3} = \sqrt{\frac{Ah}{3}} \sqrt{\frac{Bh}{3}}$$

$V_2 \quad V_1$

$$\therefore V_x = \sqrt{V_1V_2}$$

Clave **A**




TRONCO DE PIRÁMIDE REGULAR

Es aquel tronco de pirámide generado a partir de una pirámide regular.

características

- Las bases en todo tronco de pirámide son paralelas y semejantes, si el tronco es regular, las bases son regulares.
- Las caras laterales son regiones trapeciales, en el caso del tronco de pirámide regular son trapeciales isósceles.

□ $A'B'C'D - ABCD$ es un tronco de pirámide cuadrangular regular



Del gráfico:

θ : medida del ángulo entre la arista lateral y la base.

β : medida del diedro entre la cara lateral y la base.

✓ **Cálculo del área de la superficie lateral**

$$A_{S.L} = (A_{1 \text{ cara lateral}})(n^{\circ} \text{ lados de la base})$$


TRONCO DE PIRÁMIDE REGULAR

EXAMEN UNI

En un tronco de pirámide cuadrangular regular, las aristas básicas son 2 cm y 6 cm, la apotema del tronco mide 4 cm. Calcule el volumen del tronco (en cm^3).


- A) $\frac{52\sqrt{3}}{3}$ B) $\frac{78\sqrt{3}}{3}$ C) $\frac{104\sqrt{3}}{3}$
 D) $\frac{130\sqrt{3}}{3}$ E) $\frac{156\sqrt{3}}{3}$

RECUERDA:



Piden V_{TRONCO}

- Se observa que: $V_{\text{tronco}} = \frac{h}{3} (2^2 + 6^2 + \sqrt{4 \cdot 36}) \dots (i)$



- Calculemos h
- El Δ sombreado es de 60°

$$\rightarrow h = 2\sqrt{3}$$

- Reemplazamos en (i):

$$V_{\text{tronco}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} (2^2 + 6^2 + \sqrt{4 \cdot 36})$$


$$\therefore V_{\text{tronco}} = \frac{104\sqrt{3}}{3}$$



Clave **C**

TEOREMAS ADICIONALES

- ❑ Se muestra un tronco de pirámide




Se cumple:

$$X = \left(\frac{m\sqrt{A} + n\sqrt{B}}{m + n} \right)^2$$

NOTA:

El teorema se cumple para un tronco de pirámide de cualquier base

- ❑ Si el vértice de una pirámide, equidista de los vértices de su base, se cumple:




El pie de su altura coincide con el centro de la circunferencia circunscrita a la base

NOTA:

Los teoremas se cumple para pirámides de cualquier base

- ❑ Si el vértice de una pirámide, equidista de las aristas básicas, se cumple:




El pie de su altura coincide con el centro de la circunferencia inscrita en la base

CONOS SEMEJANTES

SE CUMPLE

Veamos:

Sea $\blacksquare M \parallel \blacksquare N$ 

☐ **RAZÓN DE LÍNEAS:**

$$\frac{g'}{g} = \frac{r}{R} = \frac{h}{H} = \dots$$

☐ **RAZÓN DE ÁREAS:**

$$\frac{\mathbb{B}}{\mathbb{A}} = \left(\frac{g'}{g}\right)^2 = \left(\frac{r}{R}\right)^2 = \left(\frac{h}{H}\right)^2 = \dots$$

☐ **RAZÓN DE VOLUMENES:**

$$\frac{\mathbb{V}_{V-LPQS}}{\mathbb{V}_{V-ABCD}} = \left(\frac{r}{R}\right)^3 = \left(\frac{h}{H}\right)^3 = \dots$$

➤ Para el tronco de cono, el volumen se calcula:

$$\mathbb{V}_{\text{tronco de cono}} = \frac{h'}{3} (\mathbb{A} + \mathbb{B} + \sqrt{\mathbb{A} \cdot \mathbb{B}})$$

CONO DE REVOLUCIÓN

EXAMEN UNI

Un cilindro de revolución está inscrito en un cono de revolución, de modo que una de las bases del cilindro está sobre la base del cono. Si el volumen del cono es $18m^3$, calcule el volumen del cono parcial determinado (en m^3), sabiendo que el volumen del cilindro es $3/7$ del volumen del tronco de cono.

A) $3/4$


B) $5/4$

C) $7/4$

D) $9/4$


E) $11/4$

TEOREMA



Piden $V_x =$ Volumen del cono parcial

$$V_{\text{Cono Total}} = 18m^3$$



De la semejanza de los conos:

$$\frac{V_x}{V_{\text{cono total}}} = \frac{r^3}{(2r)^3} \rightarrow \frac{V_x}{18} = \frac{1}{8}$$

Dato:

$$V_{\text{cilindro}} = \frac{3}{7} V_{\text{Tronco de cono}}$$

Reemplazando las formulas:

$$\cancel{\pi r^2 h} = \frac{3}{7} \frac{\cancel{h} \pi}{\cancel{3}} (r^2 + R^2 + Rr)$$

$$7r^2 = R^2 + r^2 + Rr$$

Resolvemos la cuadrática:

$$R^2 + Rr - 6r^2 = 0$$

$$\begin{array}{ccc} R & \searrow & 3r \\ R & \swarrow & -2r \end{array}$$

$$\Rightarrow R = 2r$$

$$\therefore V_x = 9/4$$

Clave


D

TRONCO DE CONO DE REVOLUCIÓN

Es aquel tronco de cono generado a partir de un cono de revolución.

características

- Las bases en todo tronco de cono de revolución son paralelas y semejantes.
- Todas las generatrices tienen la misma longitud.



Del gráfico:

- O y O' : Centros de las bases
- $ABCD$: Sección axial

Se cumple:

□ Volumen

$$\therefore V_{\text{tronco de cono}} = \frac{\pi h}{3} (R^2 + r^2 + R \cdot r)$$


TRONCO DE CONO DE REVOLUCIÓN

DESARROLLO DE LA SUPERFICIE LATERAL

Desarrollar la superficie lateral de un tronco de cono de revolución es aplicar su superficie sobre un plano, si esto se realiza separando una generatriz, entonces el desarrollo será un trapecio circular.

Del gráfico:

θ : Medida del ángulo de desarrollo



Se cumple:

□ **Área de la superficie lateral**

$$A_{S.L} = A_{\text{trapecio circular}}$$

$$A_{S.L} = \pi(R + r)g$$

□ **Área de la superficie total**

$$A_{S.T} = \underbrace{A_{S.L}}_{\pi(R+r)g} + \underbrace{A_{\text{base 1}}}_{\pi R^2} + \underbrace{A_{\text{base 2}}}_{\pi r^2}$$

$$A_{S.T} = \pi(R + r)g + \pi(R^2 + r^2)$$


□ **Cálculo de la medida del ángulo de desarrollo**

$$\theta = 360^\circ \left(\frac{R - r}{g} \right)$$

TRONCO DE CONO DE REVOLUCIÓN

EXAMEN UNI

En la panamericana cerca de Casma se ha formado una duna en forma de tronco de cono de revolución. Las longitudes de las circunferencias son $4\pi\text{m}$ y $2\pi\text{m}$. Ver figura. Halle el volumen de la duna en metros cúbicos.



A) 3π


B) 5π

C) 7π

D) 10π

E) 11π

Resolución:



$$\text{Piden } V_{\text{TRONCO}} = \frac{\pi h}{3} (R^2 + r^2 + R \cdot r) \dots (i)$$

Del dato:

- Longitudes de las circunferencias de las bases:

$$2\pi r = 2\pi \rightarrow r = 1$$

$$2\pi R = 4\pi \rightarrow R = 2$$

- Con ello en el triángulo rectángulo resaltado:

$$h^2 + 1^2 = \sqrt{10}^2$$

$$\rightarrow h = 3$$

- Reemplazamos en r, R, h en (i):

$$V_{\text{TRONCO}} = \frac{\pi 3}{3} (2^2 + 1^2 + 2 \cdot 1)$$

$$\therefore V_{\text{tronco}} = 7\pi$$

— ACADEMIA —

CÉSAR

VALLEJO

GRACIAS

SÍGUENOS:   

academiacesarvallejo.edu.pe